Mode d'emploi

1. Retirer le kit du réfrigérateur environ **10 minutes** avant l'utilisation.
2. Lavez-vous les mains.

Mise en route

ASSEMBLER

1



Saisissez le flacon.



Enfoncez fermement le haut du flacon dans l'adaptateur orange.

Prenez la seringue et rompez le capuchon.



Vissez l'adaptateur orange sur la seringue jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

MÉLANGER

2

Avec votre pouce, enfoncez le piston jusqu'à ce qu'il s'arrête.



Continuez à appuyer sur le piston avec votre pouce et **secouez** vigoureusement.



Tirez le piston vers le bas **au-delà** du trait de dose en pointillés noirs.

INJECTER

3

Vissez l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.



Poussez **lentement** le piston de manière à ce que le haut du piston soit aligné avec le trait de dose en pointillés noirs.



Injectez le médicament dans la zone de votre choix
[arrière du bras, ventre, cuisses]

Une vidéo du mode d'emploi du système d'injection du médicament est disponible sur:
http://click.aegate.com/go/7621

AstraZeneca

Contenu du kit unidose





Seringue



Flacon



Adaptateur au flacon





Aiguille (monoject)

Le kit unidose contient une aiguille de rechange (non illustrée) en cas de besoin.

INFORMATIONS PRATIQUES

- A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
- Le kit peut être gardé jusqu'à 4 semaines à une température ne dépassant pas 30°C avant utilisation
- Vous devez effectuer votre injection immédiatement après avoir mélangé le produit
- Le médicament doit être administré uniquement 1 fois par semaine
- Le médicament peut être administré à n'importe quel moment de la journée, avec ou sans repas

En cas de questions, veuillez consulter la notice du produit ou vous adresser à votre médecin traitant ou votre pharmacien

AstraZeneca

NS 675320 rev date 02/2015